

પ્રધાનમંત્રીએ સ્વરૂપ આપેલ
નાના બાધ્ય પદાર્થોને પ્રોસેસ કરવાનું સાહસની સ્કીમ

આમલીનો સોસ બનાવવાની પ્રક્રિયા ની પુસ્તીકા



આત્મનિર્ભર ભારત

ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી,

ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારત સરકાર,

પુડુકોટાઈ રોડ, થન્જાવુર, તામીલનાડુ ૬૧૩૦૦૫

વેબસાઈટ : <http://www.iifpt.edu.in>

ઈ-મેઈલ : info@iifpt.edu.in

ફોન : +૯૧ ૪૩૬૨ ૨૨૮૧૫૫

અનુક્રમણિકા

			પેજ નંબર
પ્રકરણ ૧	ઓળખ		
	૧.૧	આમલીનું માર્કેટ અને તેની સ્થિતિ	
		૧.૧.૧	સામાજિક અને આર્થિક અગત્યના ૧
		૧.૧.૨	વ્યાપારીક ધોરણે ઉગાડવામાં આવતી જાતો ૨
		૧.૧.૩	ખેતી ૩
		૧.૧.૪	આમલીના ઉત્પાદનની સ્થિતિ ૩
		૧.૧.૫	આમલીનું બંધારણ અને પોષક તત્વો ૫
		૧.૧.૬	આમલીથી આરોગ્યના ફાયદા ૬
	૧.૨	આમલીના ભારતીય માર્કેટની સ્થિતિ ૮	
	૧.૩	આમલીના વ્યાપારીક ઉત્પાદનો ૮	
	૧.૪	લણણી બાદ આમલીને પ્રોસેસ કરવું ૧૧	
પ્રકરણ ૨	આમલીનો સોસ બનાવવાની પ્રક્રિયા		
	૨.૧	આમલીનો સોસ બનાવવાની રીતનો ચાર્ટ ૧૨	
	૨.૨	ફળની પસંદગી ૧૨	
	૨.૩	છોડા કાઢવા અને પલાળવું ૧૩	
	૨.૪	માવો બનાવવો ૧૩	
	૨.૫	પહેલાં ગરમ કરવું ૧૩	
	૨.૬	રાંધવું અને વરાળને કાઢી નાખવી ૧૩	
	૨.૭	ભરવું અને પેક કરવું ૧૪	
	૨.૮	જંતુ મુક્ત કરવું ૧૪	
	૨.૯	પ્રોસેસ કરતી વખતે ઉદભવતી ખામીઓ અને તેનો કંટ્રોલ ૧૫	
પ્રકરણ ૩	આમલીના સોસને પેક કરવો		
	૩.૧	બગાડના કારણો ૧૬	
	૩.૨	પેકિંગની સામગ્રીના ધોરણો ૧૬	
	૩.૩	સોસ પેક કરવાની જાતો ૧૭	
	૩.૪	અધ્યતન વિકાસ ૧૭	
પ્રકરણ ૪	ખાદ્ય ઉત્પાદનોનો સુરક્ષા અને પરિમાણ		
		મશીનરીના ઉત્પાદકો અને વિકેતા ૨૩	

પ્રકરણ - ૧**ઓળખ**

૧.૧ આમલીને વનસ્પતિ તરીકે ટેમરીન્ડમ હન્ડીકા એક કહેવાય છે અને લેગુમીનાસીઅસ (કેસલપીનીઆસીઅસ) ની જાતની હોય છે. આમલીનું મુળ ગરમ આબોહવાવાળા આફ્રીકાના સુકા સવન્ના પ્રાંતનું છે. ભારત આમલીના ઉત્પાદનનો સૌથી મોટો દેશ છે અને એક જ એવો દેશ છે જ્યાં આમલીનું ઉત્પાદન વ્યાપારી ધોરણે થાય છે. ઉત્પાદનના ચોક્કસ આંકડા ધ્યાન બહાર ગયેલ સંસ્થા દ્વારા થતા નથી.

ભારતના દક્ષિણ ભાગમાં આમલી તેમના દરરોજ ના ખાનપાનમાં મુખ્ય પદાર્થ છે અને તેમની અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ થાય છે. આમલી શબ્દ અંગ્રેજીમાં ટેમરીન્ડ કહેવાય છે અને તેને આ નામ અરેબીયન શબ્દ ટેમર-ઉલ-હિંદ ઉપરથી મળેલ છે. તેનો માવો સુકા ખજૂરના રંગનો ધાડા બદામી રંગને મળતો આવતો હોવાથી આ નામ મળેલ છે અને તેથી તેને ભારતની ખજૂર તરીકે પણ ઓળખાય છે. તામીલનાડુમાં આમલીનું ઉત્પાદન ધરમપુરી, મોરાપ્પુર, કિષ્કિન્દ્રી, અન્જારી અને હાસુર એરીયામાં મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. તેની ખેતી કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં પણ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. ભારતમાં આમલીને ખેતી ખુબ જ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. પરંતુ તે ઘરની પાછળના ભાગમાં અને ખેતરોના ખોરડાંઓમાં થાય છે. આમલીનું ઉત્પાદનના સુક્ષ્મ પ્રમાણમાં પણ થતું નથી કારણ કે ગામડાંઓમાં ઘણા ઓછા લોકો આમલીને ભેગી કરે છે કારણ કે તે એક ઓછી કિંમત ઉપજાવતું , તેની ખપત ઓછી હોવાથી અને ખાટું ફળ હોવાથી ખપત ઓછી થાય છે. વધુ અવ્યવસ્થીત માર્કેટ હોવાને કારણે પણ તેની કિંમત નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે અને ગામની બહાર વેચાણ થતું નથી.

આમલી સુક્કી જમીનમાં પણ ઉગવાની ક્ષમતા છે. આમલીને ફુલ અને ફળ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે અને રસ્તાની બાજુમાં પણ ઉગાડવામાં આવે છે. ભારતમાં તે જંગલોમાં ઉગતું મોટું ઉત્પાદન થાય છે. આમલીના વૃક્ષની લાંબી જીંદગી હોવાને કારણે તેને રોપવામાં આવે તો તે આર્થિક રીતે ઘણું ઉપયોગી થાય છે. આમલીમાં ટાર્ટરીક એસીડ મુખ્ય હોવાથી તેનો ઉપયોગ ખટાશવાળા પદાર્થ તરીકે ભારતમાં જુદી જુદી જાતની રસોઈમાં થાય છે. આ વૃક્ષ અને તેના ફળ સુકી જમીનમાં અને કઠોર હવામાનમાં પણ થાય છે. તે સુકી જમીનમાં પણ ઉગી શકે છે.

૧.૧.૧ સામાજિક અને આર્થિક મહત્ત્વ

ભારતના દક્ષિણ ભાગમાં આમલીના માવાનો ઉપયોગ દરરોજની રસોઈમાં થાય છે. દારૂ જેવાં પીણાંઓ બનાવવામાં પણ તેનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. આમલીના બીયાનો પાવડરની કપડાંને કાંજી કરવાની ક્ષમતા હોવાને કારણે તેનો કાપડ ઉદ્યોગ, મીઠાઈ બનાવવામાં, પ્રસાધનો અને દવા ઉદ્યોગમાં થાય છે. તેનો ઉપયોગ રંગ કરવાની અને ચામડા કમાવવાના ઉદ્યોગોમાં પણ થાય છે. દવા તરીકે તે જુલાબ લેવા માટે, રોગ મટાડવા વપરાય છે. ફળનો માવો નાસ્તા તરીકે ખાધ પદાર્થને જાળવી રાખવા માટે અને અનેક ખાધ સામગ્રીઓ બનાવવામાં જેવાં કે ચટણી, આમલીનો ઘટ્ટ જ્યુસ, માવાનો પાવડર, પેક્ટીન, જામ, સીરપ, કેન્ડી અને પોરીજ બનાવવામાં, ટાર્ટરીક એસીડ, આલ્કોહોલ, ઉનાળામાં તાજગીભર્યા પીણાં તરીકે, સ્વાદ અને સુગંધ માટે પણ વપરાય છે.

આમલીના પાકા ફળનો ઉપયોગ મસાલા તરીકે પણ થાય છે. આમલીનું વૃક્ષ મીડીયમ અથવા મોટી સાઈઝનું હોય છે અને હંમેશા લીલા રંગનું, તેની ઉંચાઈ ૨૪ મીટર સુધી અને ઘેરાવો ૭ મીટર સુધીનો હોય છે. તેની છાલ લંબાઈ અને ઉંચાઈમાં ચીરાયેલ હોય છે. તેના

પાંદડા ૧૫ સે.મી. લાંબા, ૧૦-૨૦ પાંદડાની જોડો અને લાંબા ૮-૩૦ મી.મીટર સાઈઝના હોય છે. તેના કુલ નાના, પીળાશ પડતા અને ગુલામી પટ્ટીઓ વાળા હોય છે. તેના ફળી ૭.૫ થી ૨૦ સે.મી. લાંબી અને ૨.૫ સે.મી. પહોળી હોય છે. તેની જાડાઈ ૧ સે.મી., બીજથી ઢંકાયેલી થોડીક વળેલી અને થોડા બદામી રંગની હોય છે. તેના બી ૩-૧૨ લાંબા, દબાયેલા, ૧૫ સે.મી. ઘેરા બદામી રંગના અને ચમકતા હોય છે. તેના ફળની છાલ આછા બદામી રંગની મીઠી અથવા એસીડ જેવી ખાટી, ખાધ્ય માવો, વાંકુચુકુ, લાકડા જેવું હોય છે. ફળનું બહારનું પડ નાજુક અને જલ્દીથી અલગ કરી શકાય તેવું હોય છે.

૧.૧.૨ વ્યાપારીક ધોરણે ઉગાડવામાં આવતી જાતો

ભારતમાં મુખ્યતા વધારે વૃક્ષો જાતી પ્રમાણે ઉગાડવામાં આવે છે અને તે એક્સરખા હોતા નથી. ભારતમાં આમલીનો કદાચ કોઈ બગીચો હોય. ભારતમાં ઉગતી આમલીની કેટલીક જાતો નીચે પ્રમાણે છે.

૧. પી.કે.એમ. - ૧ : આ ક્લોન કરેલ કોઈપણ જાતના બી થી હોઈ શકે. આ વહેલા ફળ આપે છે અને લગભગ દરેક વૃક્ષ ૨૬૩ કિલો ફળ આપે છે.
૨. યુરીગમ : આ વૃક્ષની કાનરા લાંબા અને મીઠા હોય છે.
૩. પ્રતિષ્ઠાન : આ જાત મહારાષ્ટ્રમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને તેનો માવો ખાટો-મીઠો હોય છે.
૪. યોગેશ્વરી : આ જાત વધારે ફળ આપે છે અને માવાનો રંગ લાલ હોય છે.
૫. રક્તચીનોહ : આનો માવો એકદમ લાલ રંગનો હોય છે.
૬. મખ્ખનવાન : મનીલા સ્વીટ, મીઠી જાત.
૭. કમ્બમ : વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત.

૮. જગદીશ : ખાટી-મીઠી વધારે ઉત્પાદન આપતી મહારાષ્ટ્રની જાત.
૯. ડીટીએસ-૧ અને ડીટીએસ-૨ વધારે ઉત્પાદન આપતી ધારવાડ કણાટિકની જાત.
૧૦. ગોમા પ્રતિક : આ જાત સી.આઈ.એ.એચ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે અને તેનું બાળપણ ૩-૪ વર્ષનું હોય છે.

૧.૧.૩ આમલીની ખેતી

આમલીના વૃક્ષને ઊગવા માટે સુકી ગરમ હવાવાળી આબોહવા માફક આવે છે. ભારતમાં આમલીના વૃક્ષોના ઉછેર બિહાર, ઓરિસ્સા, કણાટિક, આંધ્રપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, કેરલ, તામીલનાડુ, ઉત્તરપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રમાં અને હિમાલયના નીચલા ભાગમાં કરવામાં આવે છે અને ભારત એકલો જ દેશ છે જે વ્યાપારીક ધોરણે આમલીના વૃક્ષ ઉગાડે છે.

ક્યારેક થાઈલેન્ડ સાથે તેના વેચાણમાં હરીફાઈ થાય છે. ભારત તેના ઉત્પાદનનો થોડોક ભાગ અમેરીકા, યુરોપ અને પશ્ચિમ એશીયાના દેશોમાં નિયાત કરે છે. આમલીના ઉત્પાદનનો થોડોક જ ભાગ તાજા ફળ તરીકે વપરાય છે અને વધુ પડતો ભાગ તૈયાર માવો બનાવવા અને ભારતની ઘણી બધી ચટણીઓ અને વ્યંજનોમાં ઘટક તરીકે વપરાય છે.

આમલીનું સુક્ષ્મ ઉત્પાદન ભારત માટે એક વિચિત્ર વાત છે. ગામડાંઓમાં થોડાક જ લોકો આમલી ભેગી કરે છે કારણ કે તેની કિંમત ઓછી હોય છે અને તેની માંગ પણ વધારે હોતી નથી. તેની ખાટી જાત પણ આ માટે જવાબદાર છે. વધુમાં બજારોની અવ્યવસ્થા ને કારણે પણ આમલી ગામમાંથી બહાર વેચાણ માટે આવતી નથી.

આમલીની સીઝન પ્રદેશ પ્રમાણે હોય છે. દક્ષિણમાં સૌપ્રથમ આમલીનો પાક આવે છે અને ત્યાંથી ધીરે ધીરે ઉત્તર તરફ સીઝન આવે છે. કણાટિક અને આંધ્રપ્રદેશમાં આમલીનો પાક

જાન્યુઆરીમાં, મહારાષ્ટ્રમાં ફેબ્રુઆરીમાં અને ઉત્તરના રાજ્યો જેવાં કે મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશમાં ફેબ્રુઆરીના અંતમાં આવે છે.

૧.૧.૪ આમલીની ઉત્પાદન સ્થિતિ

સ્પાઈસ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ના પ્રમાણે આમલી ૭૪.૨૦ (૦૦૦ હેક્ટર) માં ઉગાડવામાં આવતી હતી અને તેનું ઉત્પાદન ૩૦૯.૪૪ (૦૦૦ મે.ટન) ૨૦૧૭-૧૮ માં હતું અને એક હેક્ટરમાં ૪.૦ મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન થતું હતું. ભારત દુનિયામાં સૌથી વધારે આમલીનું ઉત્પાદક અને વપરાશ કર્તા છે. ભારત લગભગ ૩,૦૦,૦૦૦ મેટ્રીક ટન આમલીના ફળનું ઉત્પાદન કરે છે અને દર વર્ષે લગભગ ૫૦ કરોડના આમલીના ઉત્પાદનો નિયાત કરે છે. લગભગ ૨૫૮.૭૦ (૦૦૦ મે.ટન) થી ૨૭૨.૮૫ (૦૦૦ મે.ટન) આમલી સારી કિંમત આપતા ઉત્પાદનોમાં પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને ઘણા મજુરો આ પ્રોસેસીંગમાં કામે લાગે છે. છતાં પણ પારંપારીક રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવતું પ્રમાણ વધારે છે. તેના વ્યાપારીક ઉપયોગો જાણીતા નથી અને યોગ્ય રીતે વ્યાપક નથી.

ટેબલ - ૧ આમલીનું ભારતમાં ઉત્પાદન અને એરિયા

	રાજ્ય / યુનીયન ટેરીટરી	૨૦૧૪-૧૫		૨૦૧૫-૧૬		૨૦૧૬-૧૭	
		A	P	A	P	A	P
૧	કર્ણાટક	૧૬.૮૦	૮૭.૦૦	૧૪.૮૦	૭૨.૧૫	૧૫.૦૦	૭૦.૫૦
૨	તામીલનાડુ	૧૫.૬૫	૪૮.૮૧	૧૫.૮૧	૪૮.૬૬	૧૫.૪૦	૪૮.૧૦
૩	કેરલ	૧૧.૨૪	૩૭.૩૦	૧૧.૨૪	૩૭.૩૦	૧૧.૦૦	૩૮.૩૦
૪	આંધ્રપ્રદેશ	૪.૫૮	૧૧.૪૫	૪.૮૩	૧૧.૧૦	૪.૮૦	૧૩.૮૦
૫	તેલંગણા	૦.૪૪	૫.૩૨	૦.૨૪	૧૨.૪૮	૨.૦૦	૧૨.૫૦
૬	મહારાષ્ટ્ર	૫.૭૦	૧૧.૪૦	૫.૭૦	૧૧.૪૦	૦.૭૦	૭.૨૦
૭	મીઝોરમ	૦.૦૧	૦.૦૩	૦.૦૧	૦.૦૩	-	-
૮	અન્ય	૦.૦૬	૦.૩૫	૦.૦૬	૦.૨૮	૦.૧૦	૦.૩૦

ટોટલ	૫૪.૪૮	૨૦૧.૬૬	૫૨.૮૮	૧૮૪.૪૧	૪૮.૦૦	૧૮૦.૮૦
સોર્સ :- બાગાયત આંકડકીય શાખા ખેતી, કો-ઓપરેશન અને ખેડુત કલ્યાણ વિભાગ						

ટેબલ - ૨ રાજ્યવાર ઉત્પાદન

	રાજ્ય / યુનીયન ટેરીટરી	૨૦૧૪-૧૫	૨૦૧૫-૧૬	૨૦૧૬-૧૭
૧	મહારાષ્ટ્ર	૨.૦૦	૨.૦૦	૧૦.૨૮
૨	તેલંગાણા	૧૨.૦૮	૫૨.૦૪	૬.૨૫
૩	કર્ણાટક	૫.૧૮	૪.૮૪	૪.૭૦
૪	કેરાલા	૩.૩૨	૩.૩૨	૩.૪૫
૫	તામીલનાડુ	૩.૧૨	૩.૧૨	૩.૧૨
૬	આંધ્રપ્રદેશ	૨.૫૦	૨.૩૦	૨.૮૦
૭	મિઝોરમ	૩.૦૦	૩.૦૦	-
૮	અન્ય	૫.૮૩	૪.૬૭	૩.૦૦
	ટોટલ	૩.૭૦	૩.૬૮	૩.૮૮
સોર્સ :- બાગાયત આંકડકીય શાખા ખેતી, કો-ઓપરેશન અને ખેડુત કલ્યાણ વિભાગ				

૧.૧.૫ આમલીનું બંધારણ અને પોષક તત્ત્વો

પુષ્કળ આમલી ખાધ્ય એન્ટી-ઓક્સીડન્ટ અને ભરપુર ફીનોલીક્સ ધરાવે છે આમલી પોષક તત્ત્વો અને ઔષધીય ગુણો ધરાવે છે.

ટેબલ - ૪

આમલીના પોષક તત્ત્વો

રેન્જ %

ઘટક	સુકો પલ્પ (%)	કાયું ફળ (%)
શક્તિ (૧૦૦ ગ્રામમાં)	૧૧૫-૨૧૬ કેસીએએલ	૨૩૮ કેસીએએલ
ભેજ	૧૫.૩૦	-
પ્રોટીન્સ	૨-૮.૧૦	૨.૮
ચરબી / તેલ / લીપીડ્સ ફુડ	૦.૫-૩.૧૦	૦.૬

કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ટોટલ	૫૬.૭ થી ૮૨.૬	૬૨.૫
ખાંડ	-	૩૦-૪૧
ફાઇબર, કુડ	૨.૨ થી ૧૮.૩	૫.૧
કોલેસ્ટ્રોલ	૦	૦
ટાર્ટરીક એસીડ ટોટલ	૫૬.૭ થી ૮૨.૬	૮-૨૩.૮
રીડ્યુસીંગ સુગર	૨૫-૪૫	-
ટોટલ એશ	૨.૧૦ થી ૩.૩	-
પેક્ટીન	૨-૪	> ૪
સેલ્યુલોસીક રેસીડ્યુ	૧૮.૪૦	-
આલબ્યુનીનોઇડઝ	૩-૪	-
પ્રાપ્ત થતા ટોટલ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ	૪૧.૦૭	-
આલ્કોહોલ ઓગળી ન શકે તેવી ખાંડ	૨૨.૭	-
પાણી ઓગળી ન શકે તેવી ખાંડ	૨૦.૫૦	-
નોન-રીડ્યુસીંગ સુગર	૧૬.૫૨	-
ટોટલ સુગર્સ	૪૧.૨૦ થી ૫૮.૭	-
સ્ટાર્ચ	૫.૭	> ૬
ટેનીન (મી.ગ્રામ)	૬૦૦	-
એસ્કોર્બીક એસીડ (મી.ગ્રામ)	૩ થી ૮	૦.૭ થી ૩.૫
વિટામીન એ (આઈ યુ)	૧૫	૩૦,૦૦૦
બેટા કેરોટીન ઇકવીવેલન્ટ (યુ.જી.)	૧૦-૬૦	૧૮
રીબોફલેવીન (એમ.જી.)	૦.૦૭ થી ૦.૦૮	-
થીયામીન (એમ.જી.)	૦.૧૮ થી ૦.૨૨	૦.૪૩
વિટામીન ઇ (એમ.જી.)	-	૦.૧
વિટામીન કે (એમ.જી.)	-	૨.૮
નિયાસીન (એમ.જી.)	૦.૬ થી ૦.૭	૧.૮૪
ફોલેટ્સ (યુ.જી.)	-	૧૪
પેન્ટોથેનિક એસીડ	-	૦.૧૪
પાયરીડોક્સીન (મી.ગ્રા.)	-	૦.૦૭
સોડીયમ (એમ.જી.)	૨૪	૨૮

પોટાશ્યમ (એમ.જી.)	૧૧૬ થી ૩૭૫	૬૨૮
કેલ્શ્યમ (એમ.જી.)	૩૫ થી ૧૭૦	૭૪
કોપર (એમ.જી.)	૨૧.૮	૦.૮૬
આર્યન (એમ.જી.)	૧.૩ થી ૧૦.૮	૨.૮
મેગ્નેશ્યમ (એમ.જી.)	૭૨	૮૨
ફોસ્ફરસ (એમ.જી.)	૫૪ થી ૧૬૦	૧૧૩
સેલીનીયમ (યુ.જી.)	-	૧.૩
ઝીંક (એમ.જી.)	૧.૧	૦.૧૦
સોર્સ : યુ.એસ.ડી.એ. નેશનલ ન્યુટ્રીઅન્ડ ડેટાબેઝ		

૧.૧.૬ આમલીના સ્વાસ્થ્યવર્ધક ફાયદા

આમલીના વૃક્ષના ઘણા ભાગો જેવા કે બીયા (કચુકા) અને પાંદડાંમાં ઘણાના પોષક તત્વો હોય છે પણ આમલીના ફળ સૌથી વધુ આ લેખમાં વર્ણવ્યા છે. તેમાં સજીવ રસાયણ ના ઘટકમાં ઔષધીય ગુણો હોય છે અને ફાયટોકેમિકલ્સ એક રક્ષણનું કામ કરે છે અને મનુષ્યના તથા પ્રાણીઓને રોગો અથવા ચેપથી બચાવે છે જે નીચે મુજબ છે :

૧. આમલીના ફળ શરીરમાં રહેલ કીડા કાઢે છે, એન્ટીસેપ્ટિક, ચેપનો નાશ કરનાર, સૂર્યની ગરમીથી બચાવ, ઘા ની જલ્દી મટાડવા, અસ્થમા, ચામડીના રોગો, ગુમડાં, છાતીનો દુખાવો, કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરનાર, આંખના ચેપીરોગ, સખત કબજિયાત, ડાયાબીટીસ, ડાયેરીયા, આંખની સુઝન, મરડો, ગેલબ્લેડરના દર્દો, આંતરડાની વ્યાધી, અપચો, કમળો, કેરાટીટીસ, કૃષ્ટરોગ, જઠરની વ્યાધી, લોહતત્વોની કમી, ઉલટી થવી અને ઉબકા આવવા, (અને સુવાવડી સ્ત્રીઓને માટે-કાચા ખાટા આમલીના ફળ ખાવા) જેવા અનેક રોગોથી બચાવવાનું કામ કરે છે, વાળનું ઉત્પાદન,

ચામડીના રોગો મટાડે છે, ગળાની ખારાસ દુર કરે છે, મોચ આવવી, સોજો (જોઈન્ટનો) અને પેશાબમાં આવતા પથરીથી બચાવે છે.

૨. ફળનો માવો તાવમાં ઠંડક આપે છે અને સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોથી ચામડીનો બચાવ કરે છે. સ્નાયુઓને સ્વસ્થ થવામાં કેલ્શીયમની નળીને રોકીને મદદ કરે છે, પ્લાઝમા ફલુરાઈડ ના જમાવડો ઓછો કરે છે અને તેને લીધે જઠર અને કિડનીની બીમારીઓથી બચાવે છે, પોલીફીનોલ્સની હાજરીને કારણે વાળ ટપકવાની બીમારી અને કબજિયાત મટાડે છે. આમલીના ફળનો રસ પીવાના પાણીને સાફ કરવાનું કામ કરે છે અને પાણીમાંથી ફલ્યુરાઈન, નિકલ અને સીસાવાળા ઝેરી પદાર્થોને બહાર કાઢે છે. ફળનો માવો રેરા આપનાર છે અને તેનો રસ મનુષ્યને ચેપથી બચાવે છે. આમલીમાંથી સાફ કરેલ ઝાયલોગ્લુકેન નો ઉપયોગ આંખના ઓપરેશનમાં થતો હતો અને ઇલુગ્રોફનનો વધારે કરે છે જે ઔષધિ વિજ્ઞાનમાં એક મોટી ઉપલબ્ધી છે.
૩. કાચું અથવા અધકચરું પાકેલું ફળનો ઉપયોગ સોજો ઉતરવા, અસ્થમાની સારવારમાં, ગળફા, ગળાની ખારાશ, વિ. પોલીફીનોલ્સ તથા ફલેવોનોઈડઝની હાજરીને લીધે ઠીક થાય છે.
૪. લ્યુળીઓલની હાજરીને કારણે જીવજંતુઓથી બચાવ સ્ટેફીલોઅસ ઓરીયસ, એસ્સેરોનચેન કોલી, સુલ્મોમો સ્યુડોમોનાસ વિ.માં જોવામાં આવી હતી. આસ્પીગીલીસ એરુગીનોસા, વિ.માં ફુગને રોકવાની ક્ષમતા જોવામાં આવી હતી.

૧.૨ આમલીના ભારતીય માર્કેટની સ્થિતિ

હાલમાં ભારત આમલીના ઉત્પાદનનું મોટું મથક છે. તેનું ઉત્પાદન ગરમ આબોહવા વાળા ભારતના દક્ષિણી રાજ્યોમાં વધારે છે. આમલીને ગામના લોકો ભેગી કરીને ખુલ્લા બજારમાં વેચે છે. ઘણા જુના વખતથી ભારત પ્રોસેસ કરેલ આમલીના માવાને યુરોપ, અરબ દેશો અને અમેરીકામાં નિકાસ કરે છે. ભારત જ એક એવો દેશ છે જે આમલીને વ્યાપારીક ધોરણે ઉત્પાદન કરે છે. દેશમાં લગભગ ૫૫૦ મીલીયન ટન દેશમાં વેચાય છે અને દર વર્ષે ૭૦,૦૦૦ ટન પરદેશ નિયાત થાય છે. ભારત એક સૌથી મોટો ઉત્પાદક છે અને હજારો ટન આમલીના બીયા (કચુકા), બીયાનો પાવડર અને ફળનો માવો પરદેશ નિયાત કરે છે. આમલી જે અમેરીકામાં ફળની વ્યાખ્યામાં આવે છે. તે ભારતમાં કર્ણાટક, તામીલનાડુ અને કેરાલામાં મોટા પાયે ઉગાડવામાં આવે છે.

૧.૩ આમલીમાંથી કમાણી કરી આપતા ઉત્પાદનો

આમલીમાં ખુબ જ પોષક તત્વો અને ઔષધીય લક્ષણો છે. આમલીમાં ખાધ્ય એન્ટી-ઓક્સીડન્ટ અને ફીનોલીક થી ભરપુર છે. આ કારણસર આમલીનો ઘરગથ્થુ અને વ્યાપારીક ધોરણે ઉપયોગ થઈ શકે છે. આમલીને સાચવણીનો સમય એક મહિનો છે તેથી તેને વધારેમાં વધારે પ્રોસેસ કરી તેની કિંમત વધારી શકાય છે. કિંમતમાં વધારો કરતાં આમલીના ઉત્પાદનો માવામાંથી ઘટ્ટ જયુસ, પાવડર, અથાણું અને પેસ્ટ બનાવી શકાય છે.

૧.૩.૧ જેલોસ

જેલોસ એ અપૂર્ણ પેક્ટીન છે જેને આમલીના બીજ (કચુકા) માંથી મેળવવામાં આવે છે અને તે ગેલેક્ટ્યુરોનીક એસીડ વગરનો હોય છે. જેલોસ બનાવવા માટે મોટા પ્રમાણમાં

આમલીના કચુકાના પાવડરને ઉકળતા પાણીમાં નાખવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેમાં સાઈટ્રીક અને ટાર્ટરીક એસીડ ઉમેરવામાં આવે છે. જેની દરેકની ઘટ્ટતા ૦.૨% હોય છે. તેને ઉકળતા પાણીમાં ૩૦ થી ૪૦ મીનીટ હલાવતા રહેવું પડે છે. આ પદાર્થને આખી રાત રાખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ વ્યવસ્થિત રીતે ગાળવામાં આવે છે. આમાંથી જે માવો / પેસ્ટ નીકળે તેને ડ્રમ ડ્રાયરમાં મુકી સુકવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલું મીક્સચરની વેલોસિટી ૫% હોય છે અને મકાઈના સ્ટાર્ચ કરતાં વધારે ઘટ્ટ હોય છે. આ રીતે બનાવેલ ઉત્પાદન એક અગત્યનું ઘટક છે અને ઔદ્યોગિક રીતે તે મકાઈના સ્ટાર્ચનો વિકલ્પ બની શકે છે.

૧.૩.૨ આમલીના કચુકાનો પાવડર (ટી.કે.પી.)

રંગીન આમલીના કચુકાને કશ કરીને સફેદ રંગના બી (કચુકા) મેળવવામાં આવે છે. કચુકામાંથી જે લુગદી મેળવવામાં આવે છે. તેમાં સારી ચીકાશ હોય છે અને તે પાણીમાં ઉકાળીને મેળવવામાં આવે છે. આ રીતે મેળવેલ ટી.કે.પી. ની લાંબા સમય માટે જાળવી શકાય છે અને તે હવાના સંસર્ગમાં આવવાથી પણ ખરાબ થતી નથી.

૧.૩.૩ સુકા આમળીના બ્લોક

આમળીના વજન વધારે હોય છે તેથી તેને દુરના પ્રદેશોમાં મોકલવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાથી તેના બ્લોક બનાવીને સહેલાઈથી મોકલી શકાય. આમલીના બીયા સાથે અથવા બીયા વગરના માવાને દબાણ આપીને બ્લોક / બાર બનાવવામાં આવે છે, આવા બનાવેલા બારી બ્લોકને કિલો અથવા ક્વીન્ટલ ના ભાવે દુરની જગ્યાઓએ મોકલવામાં આવે છે.

૧.૩.૪ પુરી અથવા પેસ્ટ

આમલીના બીયાને અને રેસાઓને દુર કરી અને થોડુંક પાણી ઉમેરી થોડુંક ગરમ કરી લુગદી બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે બનાવેલ લુગદીનું ટી.એસ.એસ ૬૮° બી થી વધારે હોય છે.

૧.૩.૫ આમલીનો સોસ

આમલીની લુગદીને પુરતી ખાંડમાં ઉકાળીને બનાવવામાં આવે છે અને તે સ્વાદીષ્ટ હોય છે.

૧.૩.૬ આમલીનો મુરબ્બો

આમલીના માવાને પુરતા પ્રમાણમાં ખાંડ નાખીને ૧૦ મિનિટ સુધી ઉકાળવામાં આવે છે. તેના બીયા કાઢી નાખવામાં આવે છે અને પુરતા પ્રમાણમાં ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે. જેથી ખાંડ એસીડ અને પેક્ટીનનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે. આમલીના માવામાંથી બનાવેલ મુરબ્બો ૮ થી ૧૨ મહિના જાળવી શકાય છે.

૧.૩.૭ આમલીના માવાનો પાવડર (ટી.પી.પી.)

આમલીના માવામાંથી પાવડર બનાવવા માટે માવાનું પાણી સુકવી દેવામાં આવે છે. આમલીના માવાનો પાવડર પુરતો ઘટ્ટ હોય છે કે જેથી તે ટી.એસ.એસ ૧૮.૬-૨૫° બી અને એસીડિટી ૮.૭-૧૧% સુધી રાખી શકે છે. ટી.પી.પી. એક પાણી ઉમેર્યા બાદ ઉત્તમ પીણું બની જાય છે અને તેમાં સંપૂર્ણ એસીડિટી અને ખાટો-મીઠો સ્વાદ હોય છે. ટી.પી.પી. માવામાંથી પાણી સુકવી નાખીને અને તેમાંથી સરસ પાવડર મેળવવામાં આવે છે જે એક સારા એસીડયુલન્ટ તરીકે કામ કરે છે. ટી.પી.પી. ટાર્ટરીક એસીડનો કુદરતી સ્ત્રોત છે અને ૮-૧૮% અને સ્ટાર્ચ ખનીજ તત્ત્વો જેવા કે કેલ્શિયમ અને પોટાશિયમ હોય છે.

૧.૩.૮ આમલીનું અથાણું

આમલીના અથાણાં બનાવવા માટે પાકી ગયેલ આમલીને તેના ઉપરના છોડા કાઢી નાખી બનાવવામાં આવે છે. આમલીનું અથાણું મીઠું અને મસાલા મીક્સ કરીને બને છે. આ પ્રમાણે બનાવેલ અથાણું ૧-૧.૨ વર્ષ વાપરવા યોગ્ય રહે છે. અથાણાંનો ગરમ, મસાલેદાર, ખાટો-મીઠો સ્વાદ હોય છે. ફળને લણવામાં આવે છે અને માવો બનાવવામાં આવે છે.

૧.૩.૯ આમલીની ચટણી

આમલીની ચટણી થોડા સમય સારી રહેતી પ્રોસેસ કરેલ ઉત્પાદન છે અને તે આમલીના કાચા કતરાથી બને છે. ફળના પુરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ થી ભરપુર હોય છે. સામાન્ય રીતે આમલીની ચટણી મીઠું અને મસાલા નાખીને બનાવવામાં આવે છે અને તેને ઇંડલી અથવા ઢોંસા સાથે લેવાય છે.

૧.૩.૧૦ આમલીનો ઘટ્ટ જ્યુસ

આમલીનો ઘટ્ટ રસ પાકાં ફળને પાણીમાં ભીજવ્યા બાદ નીચોવીને લીલાં અર્ધપક્વ આમલીમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાંથી રેસા કાઢી નાખવામાં આવે છે. આ એક ઘટ્ટ રસ છે અને તેમાં કુદરતી લાંબો સમય સાચવવાના તત્વો હોય છે.

૧.૩.૧૧ આમલીના પીણાં

આમલીના ઘટ્ટ જ્યુસને પાણી નાખી પાતળો કરવામાં આવે છે. આમલીના બીજ, રેસા અને ઉપરના પડમાંથી માવો મેળવવામાં આવે છે અને ૧.૫-૨.૦ ગ્રામ માવો ૧ લીટર પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. તેમાં લેવલના જેવાં કે આદુ, મરી અને લવિંગ ઉમેરવામાં આવે છે. થોડાંક પ્રમાણમાં ખાંડ પણ ઉમેરવામાં આવે છે. આ મિશ્રણને બરાબર હલાવી પાતળા કપડાંથી ગાળી લો. આ રીતના બનાવેલ જ્યુસને ૨-૩ મહિના રાખી શકાય છે. તેને

સ્ટરીલાઇઝ બોટલમાં ભરો અને જ્યુસને જીવજંતુ મુક્ત કરવા ૮૫ ° સે ઉપર ૮ થી ૧૦ મિનિટ ઉકાળો. આ રીતે પોષક તત્વો નષ્ટ થતાં નથી.

૧.૪ આમલીની લણણી પછી પ્રોસેસ કરવું

૧.૪.૧ લણવું

આમલી પાક્યા બાદ વૃક્ષ લગભગ ૬ મહિના સુધી રાખી શકાય છે. અને તેથી ભેજનું પ્રમાણ ૨૦% કે તેથી ઓછું થઈ જાય છે. ઘણી વખત તુરંત પ્રોસેસ કરવાના ફળ ડાળીમાંથી ખેંચી લેવામાં આવે છે જેની સાથે મોટા રેસાઓ પણ હોય છે. ભારતમાં, ખેડુતો ફક્ત ડાળીને હલાવીને પાકા ફળને નીચે પાડે છે અને બાકી રહેલા ફળ પાકે ત્યારે પોતાની જાતે પડવા માટે છોડી દે છે. આમલી તોડનારને લાકડી વડે ફટકો મારીને ફળ તોડવા દેવામાં આવતા નથી કારણ કે તેથી ઉગેલાં ફુલ અને પાંદડાને નુકશાન ન થાય. તાજા ફળને વેચવા માટે ફળને કાતર /સુડી વડે શાખાઓ ઉપરથી ઉતારી લેવાં જોઈએ જેથી કરીને તેનું ઉપર પડને નુકશાન ન થાય.

૧.૪.૨ ઉપજ

પુખ્તવયનું વૃક્ષને દર વર્ષે ૩૩૦ થી ૫૦૦ પાઉન્ડ (૧૫૦-૨૨૫ કિલો) ફળ આવે છે. જેમાંથી માવા ૩૦ થી ૫૫ ટકા, ઉપરનું પડ અને રેસાઓ ૧૧ થી ૩૦ ટકા અને બીયા ૩૩ થી ૪૦ ટકા હોય છે.

૧.૪.૩ લણણી પછી સાચવણી અને વેચાણ


લણણી પછી શિંગને જમીન ઉપર ફેલાવી દેવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેની છાલ, બીયા અને રેસાઓ કાઢી નાખવામાં આવે છે અને માવો ભેગો કરવામાં આવે છે. માવાને સૂર્યના કિરણોથી સુકવી લગભગ ૬-૧૨ મહિના સાચવી રાખી શકાય છે. ઘણી વખત આખે આખું વૃક્ષ હરાજી કરવામાં આવે છે અને વહેપારી જાતે લણણી કરી વેચાણની વ્યવસ્થા કરતો હોય


છે. આમલીને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે સાચવણી કરવા માટે તેનું ઉપરનું પડ કાઢી નાખી બોક્સમાં ખાંડનું પડ કરી અથવા દબાવીને ગોળા બનાવી, કપડાંથી વિંટાળી ઠંડા, સુકા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે છે. પ્રોસેસરને મોકલવા માટે આમલીના છોંડા કાઢી નાખી, અને બોક્સમાં ખાંડનું પડ કરીને ઉકળતો રસ રેડવામાં આવે છે. આમલીનો ગોળો બનાવી તેની ઉપર મીઠાનો છંટકાવ કરીને ઇન્સ્ટ ઇન્ડિયન્સ રાખતા હોય છે. જાળામાં લોકો મીઠાવાળો માવાનો ગોળો બનાવી વરાળ આપી સૂર્યની ગરમીમાં સુકવવા મુકે છે અને અઠવાડિયા માટે ઝાકળ આપીને પથ્થરની બરણીમાં ભરે છે. ભારતમાં માવાને બીયા અને રેસા સાથે અથવા તેના વગર મીઠાનો છંટકાવ કરી (૧૦%) તેના ચોરસ બ્લોક બનાવી તાડના ઝાડના પાંદડામાં બાંધી, સાદડી જેવું બનાવી કોથળામાં ભરી વેચવા મોકલતા હોય છે. તાંબો સમય સાચવવા માટે બનાવી માવાને વરાળ આપવામાં આવે છે અથવા સૂર્યની ગરમીમાં ઘણા દિવસ સુકવવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૨

આમલીના સોસ બનાવવાનો ફલો ચાર્ટ

૨.૧ આમલીનો સોસ બનાવવા માટેની પ્રોસેસનો ચાર્ટ





૨.૨ ફળની પસંદગી

તાજાં પરિપક્વ પણ કાચા આમલીના ફળ પસંદ કરવામાં આવે છે અને પાકાં વધારે પડતાં પાકી ગયેલા ફળ તથા બગડી ગયેલાં અથવા ચેપગ્રસ્ત આમલીના કતરાઓ કાઢી નાખવામાં આવે છે. ફળને સાફ પાણીથી બરાબર ધોવામાં આવે છે. ફળને હાથથી તોડવામાં આવે છે અને તુટેલા છોડામાંથી માવો ભેગો કરવામાં આવે છે. રેસાઓને ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. છાલના ટુકડા અને બીજ (ક્યુકા) પણ માવામાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે.

૨.૩ છુટા પાડવા અને પલાળવા

આમલીને બરાબર ધોવા માટે ગથથી છુટી પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આમલીને ૧૦૦૦ લીટર કેપેસિટીવાળા ટાંકામાં ૫૫° સે ઉપર ૩-૪ કલાક પલાળવામાં આવે છે. પાણીનું પ્રમાણ ૧:૨ રાખવાની જરૂરીઆત હોય છે.

૨.૪ માવો બનાવવો

માવો મેળવવા માટે ૩ સ્ટેજની પ્રોસેસ નીચે પ્રમાણે હોય છે.

- (અ) પથ્થર કાઢવાનું મશીનનો ઉપયોગ બીયા અને મોટી સાઈઝના રેસાઓને કાઢવા માટે વપરાય છે અને ભીજવેલ આમલીમાંથી માવો મેળવાય છે. તેમાં ૬ મી.મીટરથી ચારણી હોય છે.
- (બ) પલ્પર મશન (૨ મી.મી. ના ચારણી સાથે પલ્પર મશીનની નીચે એક ફરતી વસ્તુ છે અને તેની નીચે ૨ મી.મીટરની ચારણી મુકેલ છે. ૩ મી.મીટર સુધીના કણો ફીલ્ટરમાંથી પસાર થાય છે. જ્યારે બાકી રહેલો કચરો જેવો કે બીજ, મોટા રેસાઓ અને ઉપરની છાલ નકામા હોઈ અલગ થઈ જાય છે.
- (ક) ફીનીશ-રીફાઈન કરનાર મશીન પલ્પર મશીન જેવું જ છે પરંતુ તેની ચારણી ૧ મી.મીટરની હોય છે.

૨.૫ ગરમ કરવું

માવાને આડકતરી વરાળથી ૫૫° સે + / - ૨ સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે. પ્રીહીટીંગ મશીન પણ માવાને જંતુમુક્ત કરે છે અને બેક્ટેરીયા દૂર કરે છે. ટ્યુબ્યુલર હિટ એક્સચેન્જર નો ઉપયોગ થર્મલ ટ્રીટમેન્ટ કરતાં વધારે યોગ્ય છે અને તે મોટા વેગથી કામ કરે છે અને તે કઠણ વસ્તુઓ, માવા અને રેસાના ઉત્પાદનો માટે યોગ્ય છે.

૨.૬ રાંધવું / વરાળ થવું

માવો અને તેના અન્ય ઘટકોમાંથી વરાળ રૂપે પાણી કાઢી નાખવાની પ્રક્રિયા મોટા તવામાં થતી હોય છે. ખુલ્લો મોટો તાવડો આ માટે યોગ્ય છે કારણ કે તેમાંથી ભેજ જલ્દી સુકાઈ જાય છે. ખાંડ ઉમેરવામાં આવે અને મીક્સચરને ગરમ કરતાં પહેલાં ઓછા તાપમાને રાખવાથી ખાંડ ઓગળી જાય છે. ત્યારબાદ માવામાં અન્ય ઘટકો ઉમેરવામાં આવે છે અને હલાવતાં રહેવું પડે છે. ઉકાળવાના અંતમાં રીફ્રેક્ટ્રો મીટરથી કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે અને સોસ / પુરી ૫૫° બ્રિક્સ કરાય છે.

આમલીનો સોસ બનાવવા માટે ખાંડ, મીઠું અને મસાલાઓ ઉમેરવામાં આવે છે. ખાંડનું પ્રમાણ ૯ એ / ૯ એ પલ્પ જ્યારે મીઠું એક કિલો માવા ઉપર ૩૦ ગ્રામ હોય છે. મસાલાનો ઉપયોગ રીતરીવાજ પ્રમાણે કેટલાક મસાલાઓને વાપરતાં પહેલાં શેકવા પડે છે. મસાલાઓ જેવાં કે જીરું, લવિંગ, કાળાં મરી, ઈલાયચી, સુંઠનો પાવડર, લાલ મરચાંનો પાવડર, વિ. નો ઉપયોગ થાય છે. મુળ મસાલાઓમાં લાલ મરચાંનો પાવડર, શેકેલું જીરું અને સુંઠનો પાવડર છે.

લાંબો સમય રાખવા માટે સોડીયમ બેન્ઝોનેટ અને પોટાશ્યમ મેટાબાયસલ્ફેટનો ઉપયોગ કરી શકાય. જેથી બોટલ ખોલ્યા બાદ પણ સાચવી રાખી શકાય.

૨.૭ ભરવું અને પેક કરવું

જો કાયના જારમાં સોસ ભરવામાં આવે તો ગરમ સોસને ભરવો જોઈએ. જો કાયનો જાર ઠંડો હોય તો ગરમ સોસ ભરવાથી તુટી પણ શકે છે. કાયના જાર સ્કુ જેવા ઢાંકણાથી બંધ કરવા વધારે યોગ્ય છે. અન્યથા, પ્લાસ્ટીકની બોટલ જેનું ઢાંકણ ફોઈલથી કવર કરવામાં આવ્યું

હોય તે વાપરી શકાય અથવા સોસને ઠંડો કરીને પોલીથીલીન બેગ અથવા પાઉચમાં ભરી અને ગરમીથી સીલ કરી શકાય.

ડબ્બાઓને જંતુમુક્ત કરી વાપરવા જોઈએ જેથી બગાડ થાય નહિ. કાચની બોટલને ગરમ પાણીથી જંતુમુક્ત કરી વાપરવી અને પેટ (પી.ઇ.ટી.) બોટલને ક્લોરીન વાળા ગરમ પાણીથી વાપરતાં પહેલાં ધોવી જોઈએ.

૨.૮ પેસ્ટરાઇઝેશન

આ વૈકલ્પિક છે અને કાચની બોટલોને પેસ્ટરાઇઝ કરવામાં આવે છે. આનાથી પેક કરેલ સોસ લાંબો સમય સારો રહી શકે છે. કાચની બોટલ પાણીમાં બોટલ જેટલા જ તાપમાને બોળવામાં આવે છે. બોટલ પાણીમાં ડુબવી જોઈએ. પછી બોટલને ઉકળતા પાણીમાં બેક્ટેરીયા મુક્ત કરવા ૪૫ મીનીટ સુધી પાણી ઉકળવા માંડે ત્યારથી રાખવી જોઈએ. ત્યારબાદ બોટલને ગરમ પાણીમાંથી કાઢી ધીરે ધીરે ઠંડી કરવામાં આવે છે. બોટલને પાણીમાં પલાળેલી રાખીને બીજા દિવસે પણ ઠંડી કરી વાપરી શકાય. ત્યારબાદ બોટલને સુકવીને લેબલ લગાવવામાં આવે છે.

૨.૯ પ્રોસેસ કરતી વખતે આવતી ખામીઓ અને તેનો કંટ્રોલ

- ❖ અયોગ્ય પુખ્ત, અયોગ્ય લણણી અને લણણી બાદની કાર્ય રીતી ઉત્પાદનની ગુણવત્તા ઉપર અસર કરે છે.
- ❖ ખરાબ ગુણવત્તાવાળો, કાચો માલ (આમલી અને મસાલા) થી ખરાબ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદન મળી શકે છે. ફક્ત સારી ગુણવત્તાવાળા અને ભેળસેળ વગરના મસાલા વાપરો.

- ❖ કંટ્રોલ વગરનું ઉકાળવું ઉત્પાદનને ખરાબ સ્વાદ અને રંગ આપી શકે છે. ખરાબ રીતે હલાવવાથી બળી ગયેલ ઉત્પાદન મળે. ઉકાળવાની પ્રક્રિયાને કંટ્રોલ કરો જેથી દરેક બેચમાં એક્સરખું ઉત્પાદન મળી રહે.
- ❖ એક્સરખું પ્રોસેસ કંટ્રોલ ન હોય તો બદલાયેલું અને એક્સરખું ઉત્પાદન ન મળે. બધા જ ઘટકોનું બરાબર વજન કરી વાપરો.
- ❖ વધારે પડતું પ્રીઝરવેટીવ્ઝ ખાસ કરીને બેન્ઝોનેટ (લાંબો સમય ઉપયોગમાં લેવા માટે વપરાતું) ઉત્પાદનને ખરાબ સ્વાદ આવે છે. વ્યવસ્થીત પ્રોસેસ કંટ્રોલ રાખો જેથી પ્રીઝરવેટીવનો ઉપયોગ ન કરવો પડે.
- ❖ જો કાચની બોટલ ઠંડી હોય તો તેમાં ગરમ પદાર્થ નાખવાથી બોટલ તુટી પડી શકે છે.
- ❖ અયોગ્ય રીતે જંતુમુક્ત કરેલ ડબ્બાઓ ઉત્પાદનને બગાડી શકે છે અને સાચવણીનો સમય ઓછો થાય છે. જો ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાય તેવી બોટલ વાપરતા હોવ તો તેની ગુણવત્તા ઉપર ધ્યાન આપો.
- ❖ કલોરીન વાળા (૧૦૦ પીપીએમ) પાણીથી બોટલને ધોવી.
- ❖ તીરાડો માટે ચેક કરો અને વાપરતાં પહેલાં બરાબર ધોવી જોઈએ.
- ❖ બોટલને ઉંધી કરી બોટલમાં રહેલું પાણી કાઢી નાખો.
- ❖ વાપરતાં પહેલાં બોટલને સ્ટરીલાઈઝ કરો અને ફક્ત નવાં ઢાંકણાં વાપરો.
- ❖ ફસાઈ ગયેલ હવા ઉત્પાદનને બગાડી શકે છે. ભરેલી બોટલનું વજન સીલ કરતાં પહેલાં ચેક કરો. ધ્યાન રાખો કે હવાના પરપોટા ઉત્પાદીત પદાર્થ ઉપર દેખાતા નથી.

પ્રકરણ ૩

સોસને પેક કરવો

બધા જ સોસ પ્રવાહી હોય છે અને માવો બનાવેલા ફળમાંથી બનતા હોય છે. તેમાં મીઠું, ખાંડ, તેજના અને વિનેગારનો ઉમેરો કરવામાં આવતો હોય છે. યોગ્ય સાયણીનો સમય આપવા માટે તેને બેક્ટેરીયા અને જંતુમુક્ત કરવામાં આવે છે પરંતુ સાયવણી માટે મુળતો વિનેગારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. છતાં તેમાં રહેલા સજીવ તત્ત્વો બગાડ અને ઝેરી તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરે છે. બીજા ઘટકો જેવા કે મીઠું, ખાંડ સાયવણીમાં મદદ કરતા હોય છે. ઇન્ડેક્સ બતાવે છે કે ઉત્પાદન ખોલ્યા બાદ બગડતું નથી અને એક સમયે થોડુંક વાપરી શકાય છે. સોસમાં સોડીયમ બેન્ઝોઇટ જેવા સાયવણી માટેના રસાયણો હોય છે. પરંતુ તેની જરૂર નથી જો પુરતા પ્રમાણમાં સાયવણીનું સ્તર મેળવી લીધું હોય.

સોસમાં ૩% એસીટીક એસીડ હોવો જોઈએ જે સાયવણી ની ગુણવત્તા જાળવે છે અને ૧૫ થી ૩૦% ખાંડનું પ્રમાણ ક્યાં ફળ અથવા શાકભાજી ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા છે તેની ઉપર આધાર રાખે છે.

૩.૧ બગાડનું સ્ત્રોત

સોસના બગાડનું મુળ કારણ છે સુક્ષ્મ જીવો. આ સુક્ષ્મ જીવોના પ્રમાણનો અભ્યાસ કરી બગાડને રોકવો જોઈએ. પેક કરેલ સોસમાં ઘણી વખત બેક્ટેરીયા ઉત્પન્ન કરતાં વનસ્પતિ જન્ય જીવો, ફૂગનો વધારો અને થીસ્ટ જેવા તત્ત્વો જોવા મળે છે. આમલીનો સોસ એસીડ યુક્ત હોવાથી કેચ અપ અને સોસ જલ્દીથી બગડતા નથી. ઉત્પાદિત વસ્તુની ગુણવત્તા જાળવી રાખવા માટે સોસ (અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો) ખોલ્યા બાદ રેફ્રીજરેટરમાં મુકવા જોઈએ કારણ કે રેફ્રીજરેશન બગાડને રોકે છે.

૩.૨ પેકેજિંગ સામગ્રીના માપદંડ

પેકેજિંગ ઘણા બગડી શકે તેવાં ખાદ્ય ઉત્પાદનો નો સાચવણીનો સમય વધારે છે. પેકેજ, પ્રકાશ, ભેજ, ગેસ અને અન્ય વાતાવરણની સમસ્યાઓથી બચાવ કરતાં હોવા જોઈએ. તદઉપરાંત પેકેજ ખાદ્ય વસ્તુની ગુણવત્તા, રંગ, સુગંધ, સ્વાદ ટકાવી રાખવા ઉપરાંત સ્વીકાર્ય યોગ્ય હોવું જોઈએ. પેકીંગ એવું હોવું જોઈએ કે જેથી અંદરની સુગંધ બની રહે. પેકેજ રાસાયણિક રીતે સાફ અને નિષ્ક્રિય હોવું જોઈએ અને તે વધુ પ્રોસેસીંગ ગતીમાં કામ કરતું હોવું જોઈએ. ફીકમના બાંધામાંથી સુગંધ બહાર ન નીકળી જાય અને તેથી લેમીનેશન ઉખડી જાય તે માટે રસાયણોનો પ્રતિરોધ કરે તેવા ગુંદર અને પ્રાઈમરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

૩.૩ સોસ માટે યોગ્ય પેકીંગ

અત્યારે બજારમાં સોસ કાયની બોટલોમાં, નાના વળી શકે તેવા પાઉચમાં અથવા ઉભા રહી શકે તેવા પાઉચમાં છુટથી વપરાય છે. સામાન્ય રીતે પેટ બોટલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાયની બોટલો વધારે વજનવાળી અને મોઢી હોય છે તેથી પ્લાસ્ટીકની એચ.ડી.પી.ઈ અથવા પેટ બોટલો વાપરી શકાય જે વજનમાં હલકી, સસ્તી અને આરોગ્યપ્રદ હોય છે.

૩.૪ નવા સંશોધનો

૩.૪.૧ વાળી શકાય તેવા પાઉચ

આ વ્યવસાયમાં નવા અનુસંધોનો મુજબ ફીલ્મી ફોઈલવાળા પેકેટ લીલા મરીના સોસ માટે વપરાય છે. આ પેકેટની સંરચના પ્રમાણે પોલીસ્ટરના બાંધાવાળું બહાર ધકેલી શકાય તેવી ફીલ્મનું થર લગાવવામાં આવે છે. આ સીસ્ટમમાં ઉંધું પ્રિન્ટ કરવાતું, લેમીનેશન કરવું અને કો-એક્સ્ટ્રેક્શન નું થર લગાવી નવું જ વાળી શકાય તેવું મટીરીયલ તૈયાર થાય છે. આ મટીરીયલના ઉપયોગથી લીલા મરીના સોસની સુગંધ બહાર જતી નથી અને વધુમાં બીજી ફીલ્મોની જેમ લેમીનેશન પણ નિકળી જતું નથી.

કેમીકલની પ્રતિરોધક શક્તિ ધરાવતું પડ ફોઇલને લાંબુ ટકી શકે તેવું સીલ કરે છે. ઉત્પાદીત વસ્તુની ક્ષમતા અને ખુબ જ મસાલેદાર મરીની સંરચના વાળા સોસ પેકેજીંગ ફીલ્મના ઉપયોગથી વધુ માર્કેટ મેળવી શકે. ઉત્તેજિત સુગંધના ઘટકો ફીલ્મની બહાર પ્રસરતા જોવામાં આવ્યા છે અને તે લેમીનેશન હટાવી દેતાં જોવામાં આવ્યા છે. રસાયણ પ્રતિરોધક ગુંદર અને પ્રાઇમર પેકેજીંગ ની અખંડતા જાળવી રાખે છે. પેકના અલગ અલગ થરોને જોડવું અગત્યનું છે. અનેક પડોવાળી સંરચના ને એવી રીતે સાથે રાખવામાં આવે છે કે બધા જ પડોને જોડી રાખે છે અને જારીવાળા સોસને સારી રીતે સાચવે છે.

૩.૪.૨ પી.પી. / ઇ.વી.ઓ.એચ. / પી.પી. બોટલ

નવો બાર્બિક્યુ સોસ સાથે સાથે જોડેલ વધુ પડવાથી બોટલ માર્કેટમાં મુકવામાં આવી છે. ઇથેલીન વિન્યલ આલ્કોહોલ કો-પોલીમર ને વચમાં રાખીને કંટ્રોલ ધનના રાખીને બનાવેલ બોટલ ઉત્પાદીત વસ્તુને લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખી શકે છે અને તે ઓક્સીજન અને અન્ય ગેસોને આંતરે છે અને ભેજથી થતું નુકશાન બચાવે છે.

વજનમાં હલકી, દબાવી શકાય તેવી બોટલનું પી.પી. ડીસ્પેન્સીંગ ક્લોઝર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે તેના ઢાંકણાંને પણ વચમાં મોલ્ડ કરેલ પ્લગ આપવામાં આવ્યો છે જે સોસને બહાર કાઢ્યા બાદ આપોઆપ સોસને ફરીથી સીલ કરી દે છે.

આ બોટલ અલગ અલગ ડીઝાઇન અને આકારમાં મળી શકે છે અને તેને જાડા રસો કાઢવા વાપરી શકાય છે અને સામાન્ય પ્લાસ્ટીકની બોટલથી થતાં સુગંધનો નાશ બચાવી શકાય છે. તેમાં આવેલ દિવાલ જેવું વચમાંનું પડ ઓક્સીજનને દાખલ થવા દેતું નથી અને તેની સુગંધ અને સુવાસ જાળવી રાખે છે. આ બોટલનું મટીરીયલ વધારે તાપમાન ઉપર પણ અંદર ભરેલ ઉત્પાદીત વસ્તુની ક્ષમતા જાળવી રાખે છે.

એક સાથે બધા પડોને બનાવવાની પ્રક્રિયા ઓછી કિંમતવાળા સરંજામ જેવાંકે પી.પી. / એચ.ડી.પી.ઈ. કે એલ.ડી.પી.વી. વધારે કિંમતવાળા દિવાલ જેવા વચલા પડ સાથે ઉત્પાદીત પદાર્થની જરૂરીઆત પ્રમાણે બનાવી શકાય છે.

૩.૪.૩ હીટ સેટ ટામેટા સોસની બોટલ

પેકેજીંગના ઉદ્યોગમાં આ એક નવતર પ્રોડક્ટ છે અને યુરોપની પેકેજીંગ માર્કેટમાં મુકવામાં આવ્યો છે. ૨૫૦ મી.લી. ની આ મોટા તાપમાન ઉપર ગરમ સોસ ભરવાની બનાવેલ પેટ(પી.ઈ.ટી.) બોટલ છે આ જાતનું આ પ્રથમ બોટલ છે. બોટલનો ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ પાસાવાળો છે અને તે ગરમ પ્રવાહી ભરવા માટે વધારેમાં વધારે ૯૨ ° સે નું તાપમાન ઉપર પ્રવાહી ભરી શકે છે અને ત્યારબાદ તરત જ ઠંડી કરવામાં આવે છે. તેમાં બેક્ટેરીયા મુક્ત કરવા માટે વધુમાં વધુ ૭૫ ° સે. નું તાપમાન ઉપર આવે છે. આ પેકીંગ જે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રીફોર્મનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી છે તેનું વજન ૩૫ ગ્રામ છે અને તેનો ગળાનો ભાગ ૪૫ મી.મી.નો પાસાવાળો છે. તે સ્ટાન્ડર્ડ હીટ સેટ થી ૮૫૦ (બી.પી.એચ.) મોલ્ડ થી ફુલાવે છે અને તેનો પાયાનો ભાગ પણ પાસાવાળો છે. આ બોટલ બાળકો માટે પણ સારી છે કારણ કે તે તુટે તેવી હોતી નથી.

૩.૪.૪ ચપટીમાં આવી જાય તેવી સહેલી પકડ વાળી પેટ (પી.ઈ.ટી.) બોટલ

પોલીથીલીન ટેરોથલેટ માંથી બનાવેલી આ સહેલાઈથી પકડમાં આવે તેવી પેટ (પી.ઈ.ટી.) બોટલ છે અને તેનું ફીનીશ ૬૩ મીલીમીટર છે. આ બોટલમાં ઇન્ડક્શનથી સીલ કરેલ / પોલીપ્રોપેલીનની લાઈન વગરનું ઢાંકણું છે. આ બોટલમાં ખાસ પ્રકારનું પડ બનાવવામાં આવેલ છે જેથી તે ખાત્રીપુર્વકનું સીલ લગભગ ૯૦ ° સે. તાપમાને કરવામાં આવે છે. વધુમાં આ બોટલમાં ખુણાઓ સીલ કરવાની પણ ક્ષમતા છે જે ઠંડી કરતી વખતે બોટલના ગળાના ભાગની ફીનીશમાંથી પાણી નીકળતું રોકે છે.

૩.૪.૫ ઉભા રહી શકે તેવા પાઉચ

પેકેજિંગના ઉદ્યોગમાં ઉભા રહી શકે તેવા પાઉચ એક નવીન પ્રોડક્ટ છે. આ જાતનું પેકીંગ ઉપભોક્તાની જરૂરીયાતને ધ્યાનમાં રાખી બનાવવામાં આવ્યું છે અને તે ઓછી કિંમતે એક વિકલ્પ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને તે સપાટ પાઉચમાંથી સહેલાઈથી સોસ કાઢી શકાય અને બંધ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

ઉભા રહી શકે તેવા પાઉચની ખાસીયતો :-

- ❖ પેકિંગ દ્વારા ભાવમાં વધારો
- ❖ સહેલાઈથી વાપરી શકાય તેવું પાઉચ જેમાંથી સહેલાઈથી પદાર્થ રેડી શકાય છે અને તેની ડીઝાઇનમાં બંધ કરી શકાય છે.
- ❖ અનોખું ઉભુ રહેતું પાઉચ- જે વધારે પ્રદર્શિત કરવાની ક્ષમતા રાખે છે અને પ્રોડક્ટની બ્રાન્ડના નામમાં વધારો કરે છે.
- ❖ ઓટોમેટીક પેકીંગ થાય છે.

ઉભા રહેતા પાઉચ ઘણા રંગોમાં ઉંધુ પ્રિન્ટ થઈ શકે તેવાં, લેમીનેટ કરેલ 10μ પેટ (પી.ઇ.ટી.) / 120μ -૩ ટાઇપની બી.ઇ. ફીલ્મથી બનાવવામાં આવે છે. અને તેની અંદરની વસ્તુને કેમિકલ અને બાયોલોજીક સંરક્ષણ આપે છે.

પ્રકરણ ૪

બાધ્ય સુરક્ષાના ધોરણો અને નિયમો

નિયમ પ.૩.૧૮- આમલીનો માવો / પુરી અને ઘટ્ટ રસ

૧. આમલીનો માવો / પુરી અને ઘટ્ટ રસનો અર્થ એવા ઉત્પાદન કે જે આથો આવેલા નથી અને જેને આથો લાવી શકાય છે, તાજી અથવા સુકા આમલીમાંથી ઉકાળીને અને ગાળીને મેળવેલ તથા પ્રોસેસીંગ દ્વારા અથવા માન્ય ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને અને ગાળીને બનાવેલ ઉત્પાદન.
૨. આમલીનો ઘટ્ટ રસ આમલીના માવા / પુરીમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને જેમાંથી વરાળ રૂપે પાણી ચુસી લેવામાં આવે જેથી યોગ્ય ઘટ્ટ રસ મેળવી શકાય.
૩. એફ.એસ.એસ.એ.આઈ. ના આમલીના માવા માટેના ધોરણો અને સુચનો.

ઉત્પાદન	ઓછામાં ઓછી ટી.એસ.એસ. %	ઓછામાં ઓછી એસીડીટી %	ભસ્મ ડાઈલ્યુર કરેલાં એચ.સી.એલ.માં ન ઓગળી શકે તેવી %
આમલીનો માવો / પુરી	૩૨	૪.૫	૦.૪
આમલીનો ઘટ્ટ રસ	૬૫	૯.૦	૦.૮

૪. ડબ્બા / બોટલ પુરેપુરી ભરેલી હોવી જોઈએ અને તે પાણીની ૯૦% ની ક્ષમતા કરતાં ઓછી ક્ષમતાના ન હોવા. જ્યારે પેક કરવામાં આવ્યા હોય ત્યારે હોવા જોઈએ. ડબ્બાની પાણીની ક્ષમતા ૨૦° સે ઉપર ડીસ્ટીલ કરેલ જે કન્ટેનર જ્યારે સીલ કરવામાં આવે ત્યારે પુરેપુરું ભરાઈ જાય તેવું હોવું જોઈએ.

નિયમ પ.૩.૨૮- રાંધણમાં વપરાતી ચટણી / ફળો અને શાકભાજીના સોસ ટામેટા અને સોયા સોસ સિવાયના

રાંધવા માટે વપરાતી ચટણી / માવો, ફળ અને શાકભાજીના સોસ (ટોમેટાં સોસ અને સોયા સોસ સિવાય) નો અર્થ રાંધણ ક્રિયામાં વપરાતી વધારાની વસ્તુ, જે ખાધ્ય સામગ્રી ફળ / શાકભાજી માંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં મુળમાં, બટાકા અને રીઝોનેસ, તેના માવા / પુરી, સુકાં ફળ, સીધે સીધા અથવા પોષક તત્વો વાળી મીઠી વસ્તુ, મીઠું, મસાલા અને તેજાના અને અન્ય ઉત્પાદિત વસ્તુને માટે જરૂરી હોય.

ફળ અને શાકભાજીના સોસ

- ❖ ઓગળી શકે તેવા સંપૂર્ણ ઘટ્ટ પદાર્થો (મીઠા વગરના) (એમ.એમ.) – ઓછામાં ઓછા ૧૫%
- ❖ એસીડિટી % (એસીડિક એસીડ તરીકે) – ૧.૨% થી ઓછું નહિ.

ઉમેરાતા ઘટકોના માપદંડ અને સુચવેલ ઓછામાં ઓછું સ્તર

એસ સલ્ફેમ પોટાશ્યમ ૧૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સનસેટ યલો એફ.સી.એફ ૧૦૦ મી.ગ્રામ/ કિલો
એસ્પરેટમ ૩૫૦ મી.ગ્રા. / કિલો	ટારટીયરી બ્યુટાઈલ હાઈડ્રોક્વીનોન (ટી.એસ.એચ.ક્યુ.) ૨૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
ઈન્ડીગોટાઈન (ઈન્ડીગો કેમાઈન) ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	એલ-ટાર્ટરીક એસીડ-જી.એમ.પી.
અલુરા રેડ એ.સી. ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	ડાઈમિથાઈલ પોલીસીલોક્સેન - જી.એમ.પી.
બ્યુટાઈલેટેડ હાઈડ્રોઝાયા- નીસોલ (બી.એચ.એ.) ૨૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	પ્રોપીલન ગ્લાયકોલ એલ્જીનેટ ૨૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
બ્યુટાઈલેટેડ હાઈડ્રોઝાયા ટોલ્યુન (બી.એચ.ટી.) ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	એસુરબાઈલ ઈસ્ટર્સ ૫૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
બેન્ઝોએટસ ૧૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	બેટા કેરોનીસ વેજીટેબલ ૨૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
બ્રિલીયંટ બ્લુ (એફસીએફ) ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	ઇથેલીન ડાયમાઈન ટેટ્રાએસીટેટસ (ઇડીટીએ) ૭૫ મી.ગ્રામ / કિલો

કેરોટીનો ઇંડા ૫૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	ગ્રેપ સ્કીન એક્સટ્રેક્ટ ૩૦૦ મી.ગ્રા. / કિલો
ક્લોરોફીલ્સ એન્ડ ક્લોરોફીલ, કોપર કોમ્પ્લેક્સીસ ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	અન્નાટો જી.એમ. પી.
કેન્ટા મેક્સીન ૩૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સ્ટીવીઓલ ગ્લાયકોસાઇડ ૩૫૦ મી.ગ્રામ / કિલો
કેરામલ ૩ – એમોનીયા કેરામલ ૫૦૦૦૦ મી.ગ્રામ/ કિલો	પેપ્રીકા ઓલીયોરેજન જી.એમ. પી.
કેરામલ ૪ – સલ્ફાઇટ એમોનીયા કેરામલ ૩૦૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	લોરીક આર્જનેટસ ઇથાઇલ ઇસ્ટર ૨૦૦ મી.ગ્રામ/ કિલો
ગ્યુઆઇએકરેઝીન ૬૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	નિયોટેમ ૭૦ મી.ગ્રામ / કિલો
હાયડ્રોઝાય બેન્ઝોએટસ પારા ૧૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	ફોસ્ફેટસ ૨૨૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
આર્યન ઓક્સાઇડ ૭૫ મી.ગ્રામ / કિલો	પોલીસોરબેટસ ૫૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
ફોસ્ફેટસ ૩૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સોરબેટસ ૧૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
પોમાઇઓ ૪ આર ૫૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સલ્ફાઇટસ ૩૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
પ્રોપિલ ગેલેટ ૨૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સુકોલોઝ ૪૫૦ મી.ગ્રામ / કિલો
રીબોફેવીન્સ ૩૫૦ મી.ગ્રામ / કિલો	સુકોગ્લાયસીડાઇઝ ૧૦૦૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો
સેચ્યારીન્સ ૧૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો	ફોસ્ફેટસ ૩૦૦ મી.ગ્રામ / કિલો

માઇક્રોબાયલ માપદંડ

ક્રમાંક	પેરામીટર	લીમીટ
૧	ટોટલ પ્લેટ કાઉન્ટ	પોઝીટીવ ફીલ્ડ એકઝામીન ૪૦.૦૦ થી વધારે નહિ.
૨	કોલીફાર્મ કાઉન્ટ	-
૩	ઇ-કોલી	-
૪	રોલ્મોનેલા	-
૫	શીગેલા	-
૬	સ્ટેફીલ્કોઓસારેઉસ	-
૭	યેસ્ટ અને સ્પોર્સ	૧૨૫ પર ૧/૬૦ સી.એમ.એમ. થી વધારે

		નહિ.
૮	એનઅરેબીક સ્પાઉર કાઉન્ટ	-
૯	લીસ્ટેરીયા મોનોસાયકલોજીનીસ	-

બાધ્ય સામગ્રી પ્રોસેસીંગ મશીન ઉત્પાદકોના નામ

ક્રમાંક	કંપનીનું નામ	મશીનરી
૧	એમએમએમ બુક્સાભોય એન્ડ કંપની ૧૪૦ સારંગ સ્ટ્રીટ, પ્રથમ માળ, કાર્ફર્ડ માર્કેટ નજીક, મુંબઈ, ભારત ફોન :- ૯૧ ૨૨ ૨૩૪૪ ૨૮૦૨ ફેક્સ :- ૯૧ ૨૨ ૨૩૪૫ ૨૫૩૨ yusufs@vsnl.com ; mmmb@vsnl.com ; yusuf@mmmb.in	પેકેજીંગ અને લેબલીંગ મશીનરી
૨	એક્યુફીલ મશીન્સ એસ.એફ નં. ૧૨૦/૨, કલાપટ્ટી પોસ્ટ ઓફીસ, કોઈબતુર-૬૪૧ ૦૩૫ તામીલનાડુ, ભારત ટે. +૯૧ ૪૨૨ ૨૬૬૬૧૦૮ / ૨૬૬૬૮૦૮ ફેક્સ :- +૯૧ ૪૨૨ ૨૬૬૬૨૫૫ Email :- acufilmachines@yahoo.co.in	ડ્રાયર, પેકેજીંગ અને લેબલીંગ મશીન
૩	બોમ્બે એન્જીનીયરીંગ વર્ક્સ ૧, નવયુગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ૧૮૫, ટોકરશી જીવરાજ માર્ગ, સ્વાન મીલ સામે, શિવરી (ડબલ્યુ) મુંબઈ-૪૦૦૦૧૫, ભારત ફોન :- ૯૧ ૨૨ ૨૪૧૩૭૦૮૪/૨૪૧૩૫૮૫ ફેક્સ :- ૯૧ ૨૨ ૨૪૧૩૫૮૨૮	ડ્રાયર
૪	પ્લાનર્ટસ એનર્જી નેટવર્ક (પેન), નં. ૫, પાવર હાઉસ, સ્ટ્રીટ નં. ૩, એન આર ટી નગર, થેની-૬૨૫૫૩૧, તામીલનાડુ, ભારત ફોન: ૯૧ ૪૫૪૬ ૨૫૫૨૭૨	ડ્રાયર

	ફેક્સ :- ૯૧ ૪૫૪૬ ૨૫૫૨૭	
૫	પ્રીમીયમ એન્જનીયર્સ પ્રા.લી. પ્લોટ નં. ૨૦૦૯, ફેઝ ૪, જી.આઈ.ડી.સી., વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ ફોન :- +૯૧ ૭૯ ૨૫૮૩ ૦૮૩૬ ફેક્સ :- +૯૧ ૭૯ ૨૫૮૩ ૦૮૬૫	ડ્રાયર, મીલીંગ અને ગ્રાઈન્ડીંગ મશીનરી
૬	સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્જનીયરીંગ નબી બાગ, બેરાસીયા રોડ, ભોપાલ-૪૬૨ ૦૩૮, મધ્ય પ્રદેશ, ભારત ફોન :- +૯૧ ૭૫૫ ૨૭૩૭૧૯૧ ફેક્સ :- +૯૧ ૭૫૫ ૨૭૩૪૦૧૬	સ્લાઈસીંગ, કલીનીંગ મશીનરી, મીલીંગ અને ગ્રાઈન્ડીંગ મશીનરી
૭	ગાર્ડનર્સ કોરપોરેશન ૧૫૮ ગોલ્ડલીક, નવી દિલ્લી-૧૧૦૦૦૩, ભારત ફોન :- +૯૧ ૧૧ ૩૩૪૪૨૮૭/૩૩૬૩૬૪૦ ફેક્સ :- +૯૧ ૧૧ ૩૭૧૭૧૭૯	સ્લાઈસીંગ, કલીનીંગ મશીનરી, મીલીંગ અને ગ્રાઈન્ડીંગ મશીનરી, પેકેજિંગ અને લેબેલીંગ મશીન
૮	રાજન યુનિવર્સલ એક્સપોર્ટ્સ પોસ્ટ બેગ નં. ૨૫૦ ૧૬૨, લીધી ચેટ્ટી સ્ટ્રીટ, ચેન્નાઈ-૫૦૦ ૦૦૧, ભારત ફોન :- +૯૧ ૪૪ ૨૫૩૪૧૭૧૧ / ૨૫૩૪૦૭૩૧ / ૨૫૩૪૦૭૫૧ ફેક્સ :- +૯૧ ૪૪ ૨૫૩૪૨૩૨૩	કલીનીંગ મશીનરી, મીલીંગ અને ગ્રાઈન્ડીંગ મશીનરી
૯	ગુરુદીપ પેકેજિંગ મશીન્સ હરીચંદ મીલ કમ્પાઉન્ડ, એલ.બી.એસ. માર્ગ, વિપ્રોલી, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૭૯, ભારત ફોન :- +૯૧ ૨૨ ૨૫૭૮ ૩૫૨૧/૫૭૭ ૫૮૪૬/૫૭૯ ૫૮૮૨ ફેક્સ :- +૯૧ ૨૨ ૨૫૭૭ ૨૮૪૬	પેકેજિંગ અને લેબેલીંગ મશીનરી

૧૦	રેંક એન્ડ કંપની એ-પીકે/૩, વઝીરપુર ઇન્ડ. એસ્ટેટ, દીલ્લી-૧૧૦૦૫૨, ભારત ફોન :- +૯૧ ૧૧ ૭૪૫૬૧૦૧/૨૭૪૫૬૧૦૨ ફેક્સ :- +૯૧ ૧૧ ૭૨૩૪૧૨૬/૭૪૩૩૮૦૫ E-mail :- Rank@poboxes.com	ડ્રાયર
૧૧	સૂર્યા કિચન ઇક્વીપમેન્ટ્સ થમ્માનમ, કોચી, એનાકુલમ, કેરાલા ૦૮૦૪૫૩૨૮૩૬૧	પીલર



અમને સંપર્ક કરો
ડિરેક્ટર,

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફુડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી, (આઈઆઈએફપીટી)

(ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફુડ પ્રોસેસીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારત સરકાર,)

પુલ્કોટાઈ રોડ, થન્જાવુર ૬૧૩૦૦૫, તામીલનાડુ.

ફોન : +૯૧ ૪૩૬૨ ૨૨૮૧૫૫ ફેક્સ નં. :- +૯૧ ૪૩૬૨ ૨૨૭૮૭૧

ઈ-મેઈલ : director@iifpt.edu.in વેબસાઈટ : www.iifpt.edu.in

